

【定期予防接種（20歳未満）】

方法	場所	予防接種名 (予防疾病名)	対象年齢	回数		”望ましい接種期間”	注意すること
個別接種	市内指定医療機関	B型肝炎 (B型肝炎)	生後2か月から1歳になる前まで	3回		1回目...生後2か月 2回目...生後3か月 3回目...生後7か月	27日以上の間隔を置いて2回目接種し1回目から139日以上の間隔を置いて3回目接種。
		ヒブ (ヒブ髄膜炎)	生後2か月から5歳になる前まで	初回	3回	生後2か月～11か月	27日以上の間隔(標準的には27～56日)を置いて3回(生後12か月までに)接種。
				追加	1回	3回目終了後、7～13か月までの間隔をおく	7か月以上の間隔を置いて1回接種。
		肺炎球菌 (細菌性髄膜炎等)	生後2か月から5歳になる前まで	初回	3回	生後2か月～11か月	27日以上の間隔を置いて3回接種。
				追加	1回	生後12～15か月	60日以上の間隔を置いて、生後12か月以降1回接種。
		四種混合 (ジフテリア 百日せき 破傷風 ポリオ)	生後3か月から7歳6か月になる前まで	1期 初回	3回	生後3か月～11か月	20日以上の間隔(標準的には20～56日の間を置いて3回接種。
				1期 追加	1回	3回目終了後、1年～1年半までの間隔をおく	6か月以上の間隔を置いて1回接種。
		二種混合) (ジフテリア 破傷風)	11歳以上13歳未満	2期	1回	小学6年生	1期の接種歴が必要になります。 該当年度に個別通知
		日本脳炎 (日本脳炎)	生後6か月から7歳6か月になる前まで	1期 初回	2回	3歳～4歳	6日以上(標準的には6～28日)の間隔 3歳児健診で案内配布
				1期 追加	1回	4歳～5歳	6か月以上(標準的には概ね1年)の間隔を置いて1回接種。
			2期	1回	9歳～10歳	該当年度に個別通知	
		麻疹風しん (はしか 風しん)	1歳児から2歳になる前まで	1期	1回	生後12～15か月	満1歳になったらできるだけ早く接種しましょう。
			小学校就学前の1年間	2期	1回	幼稚園・保育所年長児になったらできるだけ早く	当該年度に個別通知
水痘 (水ぼうそう)	1歳児から3歳になる前まで	初回	1回	生後12～15か月	満1歳になったらできるだけ早く接種。		
		追加	1回	初回終了後、6～12か月までの間隔をおく	3か月以上の間隔を置いて接種。		
集団接種	保健センター	BCG (結核)	生後3か月から1歳になる前まで	1回 *スタンプ方式で接種	生後5か月～7か月	実施日程は、「広報ちとせ」、「市民カレンダー」をご覧ください。	

他の予防接種を受けるときは
接種後1週間以上あける

他の予防接種を受けるときは
接種後4週間以上あける